



Praha 15. 9. 2009

48

**Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních
a lůžkových zařízeních ČR v roce 2008**

*Health care about patients taking psychoactive substances in out-patient
and in-patient establishments in Czech Republic in the year 2008*

Souhrn

V roce 2008 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 42 612 uživatelů návykových látek a proti předchozímu roku jejich počet vzrostl o 1 %. Celkem bylo hospitalizováno 60 784 případů se základní nebo vedlejší diagnózou F10–F19 ve všech lůžkových zařízeních ČR. Z toho bylo v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic zaznamenáno celkem 15 624 hospitalizací se základní diagnózou F10–F19 a jejich počet klesl o 1 %. Dalších 6 082 hospitalizací se základní diagnózou F10–F19 bylo zaznamenáno na ostatních odděleních nemocnic a 39 078 hospitalizací bylo s vedlejší diagnózou F10–F19. Během sledovaného roku absolvovalo substituční terapii 1 375 osob. Proti roku 2008 stoupl počet substituentů o 29 %.

Summary

There were 42 612 users of addictive substances treated at out-patient care establishments in the year 2008. Compared with preceding year the number of users decreased by 1 %. Altogether there were 60 784 cases of hospitalizations with main or "other" diagnosis F10–F19 in all bed care establishments in Czech Republic. Of them 15 624 were in psychiatric institutes and hospital psychiatric wards with main diagnosis F10–F19 and their number decreased by 1 %. There were also 6 082 hospitalizations with main diagnosis F10–F19 registered at hospital non psychiatric wards. In 39 078 cases of hospitalizations any of diagnosis F10–F19 were recorded as "other" diagnosis. During the year 2008 got 1 375 people through substitute therapy. Compared with year 2008 the number of persons who got through substitute therapy increased by 29 %.

V této aktuální informaci byly použity údaje z přílohy výkazu A (MZ) 1-01 - Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení - obor psychiatrie. Tato příloha obsahuje informace o léčbě alkoholiků a toxikomanů (AT péče) a vyplňují ji všechna ambulantní pracoviště AT nebo psychiatrická oddělení - pracoviště, která zajišťují ambulantní péči AT pacientů. Dalším podkladem byly údaje z Národního registru hospitalizovaných a Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek.

Ambulantní péče

Přílohu výkazu A (MZ) 1-01 - Pacienti „živé“ a „klidové“ kartotéky podle užívané psychoaktivní látky - vyplnilo 357 ambulantních oddělení a pracovišť. Počet pacientů AT pracovišť, kteří tvořili tzv. „živou kartotéku“, tzn. pacienti, kteří se aktivně léčili a navštívili pracoviště v daném roce alespoň 1x (tedy jejich záznam není starší než 1 rok) byl v roce 2008 vykázan v počtu 42 612 pacientů, o téměř 1 % více než v roce 2007 a to i přes nižší počet zdravotnických zařízení, která vyplnila přílohu výkazu. Na tento nepatrný nárůst měli vliv především pacienti užívající nealkoholové psychoaktivní látky (dg. F10–F19). Počet

pacientů s diagnózou F10 (poruchy způsobené užíváním alkoholu) zůstal téměř stejný jako v předchozím roce, pokles o 0,2 % (o 49 pacientů), zato počet pacientů s diagnózou F10–F19 vzrostl o téměř 12 % (o 1 775 pacientů). Z celkového počtu pacientů živé kartotéky tvořili více než 68 % muži a od roku 2000 se jejich podíl výrazně nezměnil.

Míra prevalence celkového počtu osob „živé kartotéky“ na ambulantních psychiatrických odděleních a AT poradnách činila u mužů 56,6 pacientů na 10 tisíc mužů a u žen 25,4 pacientek na 10 tisíc žen. Proti roku 2007 došlo k nárůstu tohoto ukazatele o 0,3 % u mužů a poklesu o 2,2 % u žen. Nejvyšší míra prevalence byla ve věkové skupině 20–39 let u mužů i u žen (88,4 pacientů na 10 tisíc mužů a 40,1 pacientek na 10 tisíc žen) a ve věkové skupině 40–64 let, a to 61,5 pacientů na 10 tisíc mužů a 30,5 pacientek na 10 tisíc žen. Proti roku 2007 došlo k růstu míry prevalence u mužů i u žen pouze ve věkové skupině 20–39 let, jak u alkoholu, tak i u ostatních psychoaktivních látek, a to o 9 % u mužů a 8 % u žen.

Při porovnání jednotlivých typů sledovaných psychoaktivních látek byla nejvyšší míra prevalence ve sledovaném roce zjištěna u alkoholu (24,2 léčených osob na 10 tisíc obyvatel), proti roku 2007 se ukazatel téměř nezměnil. Nejvíce pacientů v přepočtu na 10 tisíc osob se léčilo s problémy způsobenými nadužíváním alkoholu v Moravskoslezském kraji (38,7 pacientů na 10 tisíc obyvatel), Pardubickém kraji (38,3 pacientů) a Zlínském kraji (37,8 pacientů). Nejnižší hodnota tohoto ukazatele byla v Jihočeském a Karlovarském kraji (okolo 8 pacientů na 10 tisíc obyvatel).

Ve sledovaném roce byla míra prevalence u nealkoholových návykových látek 22,9 pacientů na 10 tisíc mužů a 10,5 pacientek na 10 tisíc žen. Proti roku 2007 vzrostla míra prevalence u mužů o více než 10 %, u žen o 5,5 %. Nejvyšší míra prevalence u nealkoholových návykových látek byla u žen ve věkové skupině 15–19 let (23 pacientek na 10 tisíc žen) a u mužů ve věkové skupině 20–39 let (51 pacientů na 10 tisíc mužů). Věkovými skupinami, kde došlo k nárůstu ukazatele proti roku 2007, byla skupina 20–39 let a 40–64 let u mužů i u žen, a to o více než 17 % u věkové skupiny 20–39 let a přibližně o 14 % u věkové skupiny 40–64 let.

U nealkoholových návykových látek bylo nejvíce pacientů léčeno v důsledku zneužívání opiátů a opioidů (4,4 pacientů na 10 tisíc obyvatel) s významným podílem uživatelů heroinu (2,9 pacientů na 10 tisíc obyvatel). Proti předchozímu roku došlo k nárůstu míry prevalence u opiátů a opioidů o 6 % a u heroinu o 15 %. Další drogou s vysokou mírou prevalence byla stimulancia (3,9 pacientů na 10 tisíc obyvatel), která vzrostla proti roku 2007 téměř o 2 %. Míra prevalence u nejrozšířenější látky ze stimulantů, typicky české drogy metamfetaminu, známější pod názvem pervitin, se téměř nezměnila (3,2 pacienti na 10 tisíc obyvatel). U všech sledovaných skupin nealkoholových návykových látek byla zjištěna vyšší míra prevalence u mužů než u žen. Výjimku tvoří skupina sedativa a hypnotika (1,9 pacientů na 10 tisíc mužů a 2,4 pacientky na 10 tisíc žen).

K největšímu nárůstu počtu léčených pacientů (v absolutních počtech) u nealkoholových psychoaktivních látek došlo u tabáku (o 37 %, tj. o 438 pacientů), u sedativ a hypnotik (o 24 %, tj. o 430 pacientů), u heroinu (o 17 %, tj. o 441 pacientů), potažmo i u celé skupiny opiátů a opioidů (o téměř 8 %, tj. 326 pacientů) a u jiných psychoaktivních látek (na trojnásobek, tj. o 240 pacientů). Postupně se zvyšují i počty léčených pacientů u kokainu, ti ve sledovaném roce vzrostli o 121 % (z 33 pacientů v roce 2007 na 73 pacientů v roce 2008). K poklesu pacientů proti předchozímu roku došlo u kombinace drog (o 31 %, tj. 1 127 pacientů) a u halucinogenů (o 11 %, tj. 21 pacientů).

Z hlediska regionálního srovnání míry prevalence byly problémem s drogami (dg. F11–F19) nejvíce zasaženy, stejně jako v předchozím roce, Hlavní město Praha (42 pacientů na 10 tisíc obyvatel) a Plzeňský kraj (23 pacientů na 10 tisíc obyvatel). Nejnižší

byla míra prevalence v kraji Zlínském a Jihočeském (3 pacienti) a Pardubickém (4 pacienti na 10 tisíc obyvatel kraje). Je nutné ale upozornit, že pacienti jsou sledováni podle sídla zdravotnického zařízení, nikoli podle adresy trvalého bydliště.

Mezi pacienty „živé kartotéky“ užívající nealkoholové psychoaktivní látky bylo evidováno 31,1 % injekčních uživatelů a jejich podíl se snížil proti roku 2007 o 5,8 procentních bodů. Nitrožilní aplikaci uvedlo 59 % uživatelů stimulancí a téměř 65 % uživatelů metamfetaminu, u opiátů a opioidů (i heroinu) to bylo téměř 50 % pacientů.

Ordinace poskytující péči AT pacientům navštěvují převážně pacienti závislí. Syndrom závislosti byl diagnostikován u 84 % pacientů užívajících alkohol, mezi uživateli nealkoholových psychoaktivních látek to bylo 88 %.

Lůžková péče

V roce 2008 zajišťovalo psychiatrickou péči 32 psychiatrických oddělení nemocnic s 1 396 lůžky, 16 psychiatrických léčeben pro dospělé s 9 240 lůžky a 3 psychiatrické léčebny pro děti s 300 lůžky. Bližší informace o personálním zajištění psychiatrické lůžkové péče jsou uvedeny v Aktuální informaci „Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zřízeních v roce 2008“.

Za jeden případ hospitalizace se považuje každé ukončení hospitalizace na jednom oddělení, ať již hospitalizace skončila propuštěním nebo úmrtím pacienta, či jeho přeložením na jiné oddělení zdravotnického zařízení. Jeden pacient může být během sledovaného období hospitalizován vícekrát a tím se počet hospitalizovaných osob a hospitalizací liší. V publikaci jsou uváděna data za případy hospitalizace.

V roce 2008 bylo v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic zaznamenáno 10 360 hospitalizací se základní diagnózou poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu (dg. F10), z toho bylo téměř 70 % mužů. Průměrná ošetrovací doba, po kterou byli pacienti hospitalizováni pro tuto diagnózu, byla 58,6 dne u mužů a 46,5 dne u žen. Pacienti s diagnózou F10 tvořili dvě třetiny všech hospitalizací pro poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek (skupina dg. F10–F19).

Od roku 2006 dochází (poprvé od roku 1999) k meziročnímu snižování celkového počtu hospitalizací na poruchy vyvolané alkoholem. Také v roce 2008 se snížil jejich počet, a to o 1,5 % a na tomto poklesu se větší měrou podíleli muži (o 1,8 %) než ženy (o 0,7 %).

Téměř polovina hospitalizací s diagnózou F10 se týkala pacientů ve věku od 40 do 54 let, pacientů starších 60 let se s touto diagnózou léčilo necelých 10 %. Ve věku 10–19 let bylo hospitalizováno 90 pacientů. V psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic zemřelo na tuto diagnózu v roce 2008 celkem 101 osob, tj. o jednu osobu více než v předchozím roce a většinu tvořili muži (83 %).

U většiny pacientů s diagnózou F10 byla po propuštění nutná další ambulantní péče, a to buď dočasná (u více než 44 % hospitalizací) nebo trvalá (u téměř 43 % hospitalizací). U téměř 8 % případů hospitalizace byla nutná další ústavní léčba a pouze necelých 5 % hospitalizací nepotřebovalo žádnou péči po propuštění z psychiatrické léčebny nebo psychiatrického oddělení nemocnice.

V souvislosti s užíváním nealkoholových návykových látek (základní diagnózy F11–F19) bylo nahlášeno celkem 5 264 hospitalizací, z toho více než 67 % tvořili muži. Z celkového počtu se léčilo více než 48 % na důsledky zneužívání více drog a jiných psychoaktivních látek (dg. F19). Druhou nejčtetnější diagnózou byla diagnóza F15 - poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním jiných stimulancí, a to cca 29 %

hospitalizací u mužů i u žen. Více než 13 % případů bylo hospitalizováno v důsledku zneužívání opiátů a opioidů (dg. F11). Mezi muži byla jako další nejčtenější diagnóza „zneužívání kanabinoidů“ - F12, a to u 4 % pacientů, u žen to byla diagnóza F13 - poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním sedativ a hypnotik, a to více než 10 % z celkového počtu hospitalizací pacientek se základní diagnózou F11–F19.

U návykových látek (bez alkoholu; F11–F19) byla průměrná ošetrovací doba téměř 30 dnů. U mužů nejdelší dobu, téměř 100 dnů, strávili pacienti v psychiatrických lůžkových zařízeních s diagnózou F18 - poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním prchavých rozpustidel, více jak jeden měsíc pak pacienti s diagnózou F14 (kokain), F17 (tabák) a F19 (více drog). U žen byly nejdéle hospitalizovány pacientky s diagnózou F13, a to 34,3 dne a s diagnózou F19 (30,5 dne).

V členění podle věkových skupin tvořili v roce 2008 téměř 51 % hospitalizací se základní diagnózy F11–F19 pacienti ve věku 20–29 let, z toho nejvíce pacientů bylo ve věku 23 let (12 % pacientů z věkové skupiny 20–29 let; 319 pacientů). V souvislosti s užíváním psychoaktivních látek zemřeli v psychiatrických lůžkových zařízeních 3 pacienti, o jednoho pacienta méně než v předchozím roce.

U 82 % hospitalizací se základní diagnózou F11–F19 byla nutná další ambulantní péče, a to u 43 % dočasná a u téměř 39 % trvalá ambulantní péče. V téměř 12 % případů hospitalizace byla nutná další ústavní léčba a pouze 6 % hospitalizací na tyto diagnózy nepotřebovalo žádnou péči po propuštění z psychiatrické léčebny nebo psychiatrického oddělení nemocnice.

Na všech odděleních nemocnic bylo celkem se základní diagnózou F10 zaznamenáno 7 814 hospitalizací a v psychiatrických léčebnách to bylo celkem 7 950 hospitalizací. S diagnózou F11–F19 bylo na všech odděleních nemocnic hospitalizováno 2 390 případů a v psychiatrických léčebnách 3 552 případů.

V roce 2008 bylo ve všech lůžkových zařízeních 39 078 hospitalizací s vedlejší diagnózou F10–F19 (o téměř 17 % více než v roce 2007). Téměř 53 % případů z těchto hospitalizací mělo vedlejší diagnózu F10 - poruchy způsobené užíváním alkoholu. Více než 47 % hospitalizací bylo s vedlejší diagnózou F11–F19 - poruchy způsobené užíváním nealkoholových psychoaktivních látek. U těchto psychoaktivních látek měla největší podíl vedlejší diagnóza F17 - poruchy způsobené užíváním tabáku, a to tři čtvrtiny z celkového počtu hospitalizovaných s vedlejší diagnózou F11–F19, dále vedlejší diagnóza F19, a to 9 % a okolo 4 % měla každá z vedlejších diagnóz F11, F12, F13 a F15.

U vedlejší diagnózy F10 tvořila 35 % hospitalizací základní diagnóza z kapitoly XIX. - poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin, téměř pětinu základní diagnóza z kapitoly V. - poruchy duševní a poruchy chování a více než 10 % případů bylo hospitalizováno se základní diagnózou z kapitoly XI. - nemoci trávicí soustavy a z kapitoly VI. - nemoci nervové soustavy.

U druhé nejčtenější vedlejší diagnózy F17 bylo nejvíce případů hospitalizováno se základní diagnózou z kapitoly IX. - nemoci oběhové soustavy, a to téměř 21 % z celkového počtu hospitalizací s touto vedlejší diagnózou. Více než 15 % hospitalizovaných bylo léčeno se základní diagnózou z kapitoly II. - novotvary a jejich počet vzrostl proti minulému roku o téměř jednu třetinu. Více než 13 % hospitalizací mělo základní diagnózu z kapitoly X. - nemoci dýchací soustavy.

U poruch způsobených užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F16, F19; bez alkoholu a tabáku) bylo nejvíce hospitalizací se základní diagnózou z kapitoly V. - poruchy duševní a poruchy chování, a to více než 52 %, se základní diagnózou z kapitoly XIX. - poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin a z kapitoly I. - některé infekční a parazitární nemoci (každá s necelými 9 %).

Poruchy způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (bez alkoholu a tabáku; vedlejší diagnóza F11–F16, F19) měli významný podíl na počtu hospitalizací v kapitole I. - některé infekční a parazitární nemoci (38 % z celkového počtu hospitalizací s vedlejší diagnózou F10–F19 v této kapitole), v kapitole V. - poruchy duševní a poruchy chování, a to 35 % hospitalizací a v kapitole XV. - těhotenství, porod a šestinedělí (29 % hospitalizací).

Věkové rozložení pacientů se liší podle typu psychoaktivní látky. U diagnózy F10 byli nejčastěji léčeni pacienti starší 40 let, a to jak v ambulantních zařízeních, tak i v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic. U nealkoholových návykových látek (diagnózy F11–F19) byl největší podíl pacientů, a to cca tři čtvrtiny, ve věku od 20 do 39 let jak v ambulantních zařízeních, tak i v psychiatrických lůžkových zařízeních. Výjimku tvoří diagnóza F13 (poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním sedativ a hypnotik), kde jsou pacienti rovnoměrně rozloženi od 20 do 75 let.

U diagnózy F10 byla u ambulantních i hospitalizovaných pacientů nejvyšší míra prevalence ve věku 40–64 let (38,1 pacientů na 10 tisíc obyvatel v ambulantních zařízeních a 18,4 pacientů na 10 tisíc obyvatel v lůžkových psychiatrických zařízeních). U diagnóz F11–F19 byla nejvyšší míra prevalence u ambulantních pacientů ve věkové skupině 20–39 let (37,3 pacientů na 10 tisíc obyvatel) a u hospitalizovaných pacientů ve věkové skupině 15–19 (12,3 pacientů na 10 tisíc obyvatel).

V roce 2008 došlo k přesunu věkové skupiny s nejvyšší mírou prevalence u ambulantních pacientů užívajících nealkoholové psychoaktivní látky (F11–F19) z věkové skupiny 15–19 let v předchozím roce do věkové skupiny 20–39 let.

Substituční léčba

Od května roku 2000 funguje v České republice Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (dále jen Registr substituce), jehož správcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Substituční terapii poskytovalo zpočátku 8 akreditovaných pracovišť a jejich počet postupně narostl až ke 14 zařízením v roce 2007.

Nejvýznamnější změnu přinesla novela zákona č. 379/2005 Sb., podle níž je povinností všech lékařů poskytujících substituční léčbu hlásit své pacienty do Registru substituce a zabránit tak vícenásobné preskripci, což je zároveň primárním účelem tohoto registru. Vzhledem k předpokládanému nárůstu počtu osob hlásících do Registru substituce i počtu hlášených probíhaly v roce 2007 práce na změně dosavadní technologie na webovou aplikaci. V listopadu 2007 byla zahájena registrace zdravotnických zařízení do této aplikace a její ostrý provoz. V roce 2008, kdy se do elektronické verze Registru substituce hlásila i neakreditovaná pracoviště (např. psychiatrické ambulance, stacionáře, ...), přibýlo 8 hlásících zařízení.

V roce 2008 absolvovalo substituční terapii 1 375 osob, ve věkové skupině od 15 do 54 let, přičemž nejstaršími pacienty byli muži. Do substitučního programu se v roce 2008 přihlásilo k léčbě celkem 887 osob (621 mužů a 266 žen) ve věku od 17 do 54 let. Díky nové aplikaci a vyššímu počtu hlásících lékařů bylo nahlášeno dvakrát víc osob než v předchozím roce (443 osob v roce 2007). Léčbu během roku 2008 ukončilo celkem 517 osob (355 mužů a 162 žen), o téměř 14 % více než v roce 2007.

Více informací z Registru substituce najdete v Aktuální informaci „Údaje v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek“, která je k dispozici od roku 2006.

Vypracovala: Ing. Blanka Nechanská

Substituční léčba v roce 2008

Věková skupina	Počet léčených osob			Počet léčených případů		
	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem
15–19	17	21	38	19	21	40
20–24	183	118	301	202	137	339
25–29	394	173	567	452	205	657
30–34	216	73	289	260	90	350
35–39	93	18	111	122	24	146
40–44	35	8	43	45	9	54
45–49	16	-	16	19	-	19
50–54	10	-	10	10	-	10
Celkem	964	411	1 375	1 129	486	1 615

Přehled použitých diagnóz MKN-10

- F10** Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu
- F11** Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním opioidů
- F12** Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním kanabinoidů
- F13** Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním sedativ nebo hypnotik
- F14** Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním kokainu
- F15** Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním jiných stimulantů, včetně kofeinu
- F16** Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním halucinogenů
- F17** Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku
- F18** Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním prchavých rozpustidel
- F19** Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním více drog a jiných psychoaktivních látek


Pacienti "živé kartotéky" podle psychoaktivní látky a věku v ambulantních zařízeních

Psychoaktivní látka - pacienti "živé kartotéky"	0–14 let		15–19 let		20–39 let		40–64 let		65 let a více		Celkem	
	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
Alkohol	7	9	264	92	6 154	2 779	9 207	4 374	1 682	725	17 314	7 979
Opiáty a opioidy	-	1	142	74	2 731	1 242	266	95	17	17	3 156	1 429
z toho heroin	-	-	77	33	1 963	826	131	24	1	-	2 172	883
Kanabinoidy	13	7	361	139	788	229	72	10	1	-	1 235	385
Sedativa a hypnotika	-	1	65	44	416	457	357	582	118	189	956	1 273
Kokain	-	-	8	3	34	14	10	4	-	-	52	21
Stimulancia	2	1	386	330	2 264	804	249	50	13	4	2 914	1 189
z toho metamfetamin	2	-	302	268	1 907	626	198	20	6	1	2 415	915
Halucinogeny	-	-	37	9	74	9	48	-	-	-	159	18
Tabák	4	-	97	27	524	305	347	211	66	27	1 038	570
Prchavá rozpustidla	2	-	26	4	37	2	6	2	-	-	71	8
Kombinace drog	3	1	134	65	1 550	353	244	115	10	14	1 941	548
Jiné	-	-	24	15	140	71	57	43	2	4	223	133
Nealkoholové drogy - celkem	24	11	1 280	710	8 558	3 486	1 656	1 112	227	255	11 745	5 574
Celkový počet pacientů v "živé kartotéce"	31	20	1 544	802	14 712	6 265	10 863	5 486	1 909	980	29 059	13 553


Pacienti "živé kartotéky" podle způsobu aplikace a komplikací v ambulantních zařízeních

Psychoaktivní látka - pacienti "živé kartotéky"	Prevalence			Injekční			Intoxikace, poruchy chování (%)	Somatické a psych. poškození (%)	Závislost (%)
	na 10 000 obyvatel			aplikace drog (%)					
	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem			
Alkohol	33,7	15,0	24,2	x	x	x	5,4	11,0	83,7
Opiáty a opioidy	6,1	2,7	4,4	51,4	41,9	48,5	3,3	4,0	92,6
z toho heroin	4,2	1,7	2,9	50,4	47,7	49,6	2,1	3,4	94,5
Kanabinoidy	2,4	0,7	1,5	0,6	0,8	0,6	18,8	7,7	73,5
Sedativa a hypnotika	1,9	2,4	2,1	1,9	2,0	1,9	6,2	5,7	88,1
Kokain	0,1	0,0	0,1	-	-	-	1,4	1,4	97,3
Stimulancia	5,7	2,2	3,9	62,0	50,0	58,5	5,9	4,4	89,7
z toho metamfetamin	4,7	1,7	3,2	67,6	56,4	64,5	5,5	4,6	89,9
Halucinogeny	0,3	0,0	0,2	3,8	22,2	5,6	24,3	3,4	72,3
Tabák	2,0	1,1	1,5	x	x	x	4,1	5,2	90,7
Prchavá rozpustidla	0,1	0,0	0,1	-	-	-	30,4	7,6	62,0
Kombinace drog	3,8	1,0	2,4	28,4	27,6	28,2	6,7	6,7	86,5
Jiné	0,4	0,2	0,3	-	-	-	3,9	0,8	95,2
Nealkoholové drogy - celkem	22,9	10,5	16,5	34,2	24,7	31,1	6,7	5,1	88,2
Celkový počet pacientů v "živé kartotéce"	56,6	25,4	40,7	13,8	10,2	12,6	5,9	8,6	85,5

Podíl pacientů "živé kartotéky" ambulantních pracovišť AT nebo psychiatrických zařízení podle věku



Podíl užívaných psychoaktivních látek u pacientů "živé kartotéky" - celkem



Počet hospitalizovaných podle základních diagnóz a pohlaví

Diagnóza	Muži			Ženy			Celkem		
	absolutně	na 100 000 obyvatel	prům. ošetř. doba	absolutně	na 100 000 obyvatel	prům. ošetř. doba	absolutně	na 100 000 obyvatel	prům. ošetř. doba
F10	7 072	137,7	58,6	3 288	61,7	46,5	10 360	99,0	54,8
F11	482	9,4	17,8	231	4,3	17,5	713	6,8	17,7
F12	136	2,6	21,1	25	0,5	16,9	161	1,5	20,4
F13	92	1,8	25,7	178	3,3	34,3	270	2,6	31,4
F14	3	0,1	36,7	-	-	-	3	0,0	36,7
F15	975	19,0	29,1	549	10,3	24,8	1 524	14,6	27,5
F16	13	0,3	13,1	-	-	-	13	0,1	13,1
F17	4	0,1	38,5	-	-	-	4	0,0	38,5
F18	46	0,9	95,5	2	0,0	4,5	48	0,5	91,7
F19	1 783	34,7	33,9	745	14,0	30,5	2 528	24,2	32,9
Celkem	10 606	206,5	49,2	5 018	94,1	39,8	15 624	149,3	46,2

Počet hospitalizovaných podle základních diagnóz a věkových skupin

Věková skupina	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19
10–14	6	-	7	-	-	15	-	-	7	11
15–17	34	23	48	1	-	206	1	-	4	140
18–19	50	18	16	1	-	149	2	-	2	173
20–24	257	151	40	13	1	509	7	-	8	633
25–29	613	272	26	12	-	339	3	-	7	653
30–34	1 188	150	9	26	1	196	-	-	12	396
35–39	1 314	47	5	20	1	81	-	-	8	184
40–44	1 648	18	1	39	-	19	-	1	-	117
45–49	1 552	5	1	26	-	8	-	-	-	73
50–54	1 616	15	4	34	-	2	-	-	-	56
55–59	1 163	6	4	25	-	-	-	2	-	43
60–64	594	5	-	27	-	-	-	-	-	35
65–69	209	1	-	17	-	-	-	1	-	12
70–74	70	1	-	15	-	-	-	-	-	2
75–79	36	1	-	8	-	-	-	-	-	-
80+	10	-	-	6	-	-	-	-	-	-
Celkem	10 360	713	161	270	3	1 524	13	4	48	2 528

Počet hospitalizovaných podle skupin základních diagnóz, potřeby další péče a pohlaví

Další péče	F10				F11–F19			
	muži		ženy		muži		ženy	
	absol.	průměrný věk	absol.	průměrný věk	absol.	průměrný věk	absol.	průměrný věk
Žádná	315	47,1	103	44,5	202	27,2	88	29,7
Dočasná ambulantní	3 124	42,7	1 676	44,5	1 509	27,5	864	29,2
Trvalá ambulantní	3 035	44,8	1 276	46,7	1 373	29,3	518	32,4
Ústavní léčba	553	47,4	219	45,7	418	26,2	231	25,0
Ústav. sociál. služba	34	55,6	13	56,0	28	20,5	26	19,8
Domácí ošetřov. péče	10	47,8	1	54,0	3	27,3	2	20,5
Lázeňská péče	1	33,0	-	-	1	34,0	1	44,0
Celkem	7 072	44,3	3 288	45,5	3 534	28,0	1 730	29,5

Počet hospitalizací podle vedlejších diagnózy

Základní diagnóza podle kapitol	Vedlejší diagnózy										Celkem
	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	
I. Některé inf. a paraz. nem.	278	72	13	4	1	159	10	367	1	133	1 038
II. Novotvary	454	25	7	2	3	4	3	2 097	4	22	2 621
III. Nem. krve, krvetvor. org.	85	6	1	2	1	4	1	60	1	3	164
IV. Nem. endokrin., výživy	376	14	12	6	2	7	-	290	1	10	718
V. Poruchy dušev. a chov.	4 068	139	476	414	10	370	12	567	15	1 031	7 102
VI. Nemoci nervové soust.	2 089	56	18	11	9	11	3	687	3	52	2 939
VII. Nemoci oka	22	4	2	1	-	1	-	23	4	1	58
VIII. N. ucha, bradav. výběž.	16	3	1	1	-	-	-	55	2	-	78
IX. Nem. oběhové soustavy	1 463	85	16	20	9	17	9	2 828	11	87	4 545
X. Nem. dýchací soustavy	732	60	11	11	1	13	3	1 883	10	30	2 754
XI. Nem. trávicí soustavy	2 090	62	32	21	8	14	8	943	5	44	3 227
XII. Nemoci kůže	196	32	4	5	-	13	5	163	2	20	440
XIII. Nem. sval., kost. soust.	349	29	10	20	9	4	5	1 382	2	30	1 840
XIV. Nem. moč., pohl. soust.	173	21	5	14	1	10	3	452	4	21	704
XV. Těhotenství, porod	31	23	14	9	-	10	4	180	3	24	298
XVI. Stavy vzniklé v perin. odb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
XVII. Vrozené vady, deform.	4	2	1	-	-	-	-	14	-	2	23
XVIII. Abnorm. klin. stavy	840	24	36	15	3	13	7	641	3	41	1 623
XIX. Poranění, otravy	7 151	112	59	41	11	59	15	732	9	97	8 286
XXI. Faktory ovliv. zdr. stav	180	8	13	4	1	8	1	391	-	13	619
Celkem	20 597	777	731	601	69	717	89	13 755	80	1 662	39 078

Struktura hospitalizovaných v lůžkových psychiatrických zařízeních podle užívané psychoaktivní látky

